

Rx

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: SOLUXKY 5G

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

2. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 gói x 8 g

Thành phần dược chất:

L-ornithin - L-aspartat 5000 mg

Thành phần tá dược: Sorbitol, Natri hydrocarbonat, Natri saccharin, Acid citric anhydrous, Povidon k30

3. Dạng bào chế: Thuốc cốm sủi bột

Mô tả sản phẩm: Thuốc cốm khô tươi, không bị ẩm, vón, màu trắng đến trắng ngà đồng nhất

4. Chỉ định:

- Tăng cường giải độc ammoniac nhờ tăng tổng hợp urê ở gan. Giải độc ammoniac trong các mô ở ngoài gan
- Điều trị các rối loạn đồng thời hoặc thứ phát trong các trường hợp suy giảm chức năng gan như xơ gan với các triệu chứng tiềm ẩn và rõ rệt của bệnh hôn mê gan

5. Cách dùng, liều dùng:

- Liều khuyến cáo 1 – 2 gói/lần, 2 lần/ngày, tương ứng tối đa 20 gam L-ornithin - L-aspartat/ngày

Không dùng thuốc cho trẻ em

* *Cách dùng:* Hòa tan thuốc với một cốc nước. Khi thuốc bột được hòa tan, ban đầu dung dịch sủi bột, uống khi sủi hết bột, dung dịch trong không màu, uống ngay sau khi pha. Uống thuốc sau bữa ăn

6. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với L-ornithin - L-aspartat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Suy thận nặng: trường hợp creatinin trong huyết thanh vượt quá 3 mg/100 ml cần hết sức thận trọng khi dùng

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Sản phẩm có chứa 1058 mg/gói thuốc bột sorbitol, do đó khi dùng thuốc, cần tính toán lượng Sorbitol đưa vào cơ thể qua ăn uống
- Sorbitol có thể ảnh hưởng đến sinh khả dụng của các thuốc khác nếu dùng đồng thời
- Sorbitol có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và tác dụng nhuận tràng nhẹ.
- Sản phẩm có chứa 239 mg/gói thuốc bột natri, tương đương 11,95% liều lượng khuyến nghị của WHO theo liều tối đa hàng ngày 2g natri cho người lớn.

8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- **Thời kỳ mang thai:** Chưa có tài liệu về độ an toàn cho phụ nữ mang thai nên cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai, cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích điều trị.
- **Thời kỳ cho con bú:** Chưa có tài liệu chứng minh L-ornithin - L-aspartat có vào sữa mẹ hay không nên cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú, cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích điều trị.

9. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Do các triệu chứng của bệnh và việc dùng thuốc này có thể làm giảm khả năng lái xe và vận hành máy móc nên thận trọng khi sử dụng cho những đối tượng này

10. Tương tác, tương kỵ của thuốc

- Tương tác thuốc: Chưa có thông tin