



# aseFloriss<sup>®</sup>

Số lô SX/ HD:

Sản xuất tại:



ISO 9001:2015  
GMP - WHO

**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XÍN PASTEUR ĐÀ LẠT**

18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

ĐT: (0263) 3822022 - Fax: (0263) 3827773

Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)

Hotline: 1800.5555.74

#### Thành phần:

Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:

*Lactobacillus acidophilus*.....10<sup>8</sup>CFU/g

Tá dược vừa đủ.....1g

*Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.*

SĐK (Reg.No): QLSP-977-16



# aseFloriss<sup>®</sup>

Số lô SX/ HD:

Sản xuất tại:



ISO 9001:2015  
GMP - WHO

**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**

18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

ĐT: (0263) 3822022 - Fax: (0263) 3827773

Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)

Hotline: 1800.5555.74

**Thành phần:**

Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:

*Lactobacillus acidophilus*.....10<sup>9</sup>CFU/g

Tả dược vừa đủ.....1g

*Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.*

SĐK (Reg.No): QLSP-977-16



# aseFloris®

Số lô SX/ HD:

Sản xuất tại:



ISO 9001:2015  
GMP - WHO

**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**

18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

ĐT: (0263) 3822022 - Fax: (0263) 3827773

Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)

Hotline: 1800.5555.74

### Thành phần:

Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:

*Lactobacillus acidophilus*.....10<sup>8</sup>CFU/g

Tá dược vừa đủ.....1g

*Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.*

SĐK (Reg.No): QLSP-977-16



# ase Floris®

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.**

**Tên thuốc:** aseFLORIS

**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:

- Thành phần dược chất: *Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup> CFU/g.  
- Thành phần tá dược: Lactose, Glucose, Saccharose, Amidon (Tinh bột).

**Dạng bào chế:** Bột cốm pha uống.

**Quy cách đóng gói:**

Hộp lớn gồm 10 hộp nhỏ x 10 gói x 1g

**Chỉ định:**

aseFLORIS được dùng trong các trường hợp sau:

- Điều trị phụ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.
- Thay thế vi khuẩn chỉ bị mất do dùng kháng sinh.
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**

Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.

Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng và cách dùng:**

**- Liều dùng:**

- + Trẻ dưới 3 tuổi : 1 gói/ngày.
- + Trẻ trên 3 tuổi : 1 - 2 gói/ngày.
- + Người lớn : 2 - 3 gói/ngày.

**- Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác. Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Thận trọng:**

1. Cần thận khi dùng thuốc cho bệnh nhân đang được điều trị bởi bác sĩ.
2. Theo đúng liều lượng và cách dùng.
3. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 3 tuổi.

**Tác dụng không mong muốn:**

Tăng sự sinh hơi ở ruột, nhưng sẽ giảm dần trong quá trình điều trị. Đôi khi táo bón, hiếm khi xảy ra dị ứng: phát ban, ngứa, chóng mặt.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**Hướng dẫn cách xử trí ADR:**

Chưa có ADR đặc biệt cần xử trí.

**Tương tác với thuốc khác:**

Thận trọng khi dùng chung với kháng sinh Tetracycline.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít. Tốt nhất không dùng khi mang thai. Không có chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

**Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:**

Không ảnh hưởng.

**Quá liều:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**Số ĐK (Reg.No):** QLSP-977-16

**ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẮM TAY TRẺ EM**



**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**

Số 18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

ĐT: (0263) 3822022 ; Fax: (0263) 3827773

Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)

Hotline: 1800.5555.74



# ase Floris®

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.**

**Tên thuốc:** aseFLORIS

**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:

- Thành phần dược chất: *Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup> CFU/g.
- Thành phần tá dược: Lactose, Glucose, Saccharose, Amidon (Tinh bột).

**Dạng bào chế:** Bột cốm pha uống.

**Quy cách đóng gói:**

Hộp lớn gồm 10 hộp nhỏ x 10 gói x 1g

**Chỉ định:**

aseFLORIS được dùng trong các trường hợp sau:

- Điều trị phụ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.
- Thay thế vi khuẩn chí bị mất do dùng kháng sinh.
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**

Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.  
Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng và cách dùng:**

**- Liều dùng:**

- + Trẻ dưới 3 tuổi : 1 gói/ngày.
- + Trẻ trên 3 tuổi : 1 - 2 gói/ngày.
- + Người lớn : 2 - 3 gói/ngày.

**- Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác. Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Thận trọng:**

1. Cần thận khi dùng thuốc cho bệnh nhân đang được điều trị bởi bác sĩ.
2. Theo đúng liều lượng và cách dùng.
3. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 3 tuổi.

**Tác dụng không mong muốn:**

Tăng sự sinh hơi ở ruột, nhưng sẽ giảm dần trong quá trình điều trị. Đôi khi táo bón, hiếm khi xảy ra dị ứng: phát ban, ngứa, chóng mặt.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**Hướng dẫn cách xử trí ADR:**

Chưa có ADR đặc biệt cần xử trí.

**Tương tác với thuốc khác:**

Thận trọng khi dùng chung với kháng sinh Tetracycline.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít. Tốt nhất không dùng khi mang thai. Không có chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

**Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:**

Không ảnh hưởng.

**Quá liều:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**Số ĐK (Reg.No):** QLSP-977-16

**ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẮM TAY TRẺ EM**



**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**

Số 18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

ĐT: (0263) 3822022 ; Fax: (0263) 3827773

Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)

Hotline: 1800.5555.74



# ase Floris®

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.

**Tên thuốc:** aseFLORIS

**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:

- Thành phần dược chất: *Lactobacillus acidophilus* 10<sup>9</sup> CFU/g.
- Thành phần tá dược: Lactose, Glucose, Saccharose, Amidon (Tinh bột).

**Dạng bào chế:** Bột cốm pha uống.

**Quy cách đóng gói:**

Hộp lớn gồm 10 hộp nhỏ x 10 gói x 1g

**Chỉ định:**

aseFLORIS được dùng trong các trường hợp sau:

- Điều trị phụ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.
- Thay thế vi khuẩn chí bị mất do dùng kháng sinh.
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**

Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.

Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng và cách dùng:**

**- Liều dùng:**

- + Trẻ dưới 3 tuổi : 1 gói/ngày.
- + Trẻ trên 3 tuổi : 1 - 2 gói/ngày.
- + Người lớn : 2 - 3 gói/ngày.

**- Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác. Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Thận trọng:**

1. Cần thận khi dùng thuốc cho bệnh nhân đang được điều trị bởi bác sĩ.
2. Theo đúng liều lượng và cách dùng.
3. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 3 tuổi.

**Tác dụng không mong muốn:**

Tăng sự sinh hơi ở ruột, nhưng sẽ giảm dần trong quá trình điều trị. Đôi khi táo bón, hiếm khi xảy ra dị ứng: phát ban, ngứa, chóng mặt.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**Hướng dẫn cách xử trí ADR:**

Chưa có ADR đặc biệt cần xử trí.

**Tương tác với thuốc khác:**

Thận trọng khi dùng chung với kháng sinh Tetracycline.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít. Tốt nhất không dùng khi mang thai. Không có chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

**Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:**

Không ảnh hưởng.

**Quá liều:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**Số ĐK (Reg.No):** QLSP-977-16

**ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TÂM TAY TRÈ EM**

Sản xuất tại:



ISO 9001:2015  
GMP - WHO

**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**

Số 18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

ĐT: (0263) 3822022 ; Fax: (0263) 3827773

Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)

Hotline: 1800.5555.74

**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g  
Tã được vừa đủ 1g

**Chỉ định:**  
- Điều trị phụ trong tiêu chảy cũng với biện pháp tiếp nước và điện giải.  
- Thay thế vi khuẩn chỉ bị mất do dùng kháng sinh.  
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**  
- Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh hoặc thiếu lactase.  
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng:**  
+ Trẻ dưới 3 tuổi: 1 gói/ngày.  
+ Trẻ trên 3 tuổi: 1 - 2 gói/ngày.  
+ Người lớn: 2 - 3 gói/ngày.

**Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác.  
Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

*Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.*

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

# ase Floris®

*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

**Thuốc bột cốm  
10 gói x 1g**

**ase Floris®**  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

Sản xuất tại:  
  
ISO 9001:2015  
GMP - WHO

CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT  
18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng  
ĐT: (0263) 3822022 - Fax: (0263) 3827773  
Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)  
Hotline: 1800.5555.74

Số ĐK (Reg. No): QLSP-977-16  
Tiêu chuẩn: TCCS  
Số lô sản xuất (Lot):  
Ngày sản xuất (Mfd.):  
Hạn dùng (Exp):



**ase Floris®**  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

# ase Floris®

*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

**Thuốc bột cốm  
10 gói x 1g**

**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g  
Tã được vừa đủ 1g

**Chỉ định:**  
- Điều trị phụ trong tiêu chảy cũng với biện pháp tiếp nước và điện giải.  
- Thay thế vi khuẩn chỉ bị mất do dùng kháng sinh.  
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**  
- Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh hoặc thiếu lactase.  
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng:**  
+ Trẻ dưới 3 tuổi: 1 gói/ngày.  
+ Trẻ trên 3 tuổi: 1 - 2 gói/ngày.  
+ Người lớn 2 - 3 gói/ngày.

**Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây; thức uống khác.  
Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

*Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.*

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

# ase Floris®

*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

**Thuốc bột cốm  
10 gói x 1g**

**ase Floris®**  
Lactobacillus acidophilus 10<sup>8</sup> CFU/g

Sản xuất tại:  
**DAVAC**  
ISO 9001:2015  
GMP - WHO

CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT  
18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng  
ĐT: (0263) 3822022 - Fax: (0263) 3827773  
Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)  
Hotline: 1800.5555.74

Số ĐK (Reg. No): QLSP-977-16  
Tiêu chuẩn: TCCS  
Số lô sản xuất (Lot):  
Ngày sản xuất (Mfd.):  
Hạn dùng (Exp.):



**ase Floris®**  
Lactobacillus acidophilus 10<sup>8</sup>CFU/g

# ase Floris®

*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

**Thuốc bột cốm  
10 gói x 1g**



**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g  
Tã được vữa đủ..... 1g

**Chỉ định:**  
- Điều trị phụ trong tiêu chảy cũng với biện pháp tiếp nước và điện giải.  
- Thay thế vi khuẩn chỉ bị mất do dùng kháng sinh.  
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**  
- Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh hoặc thiếu lactase.  
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng:**  
+ Trẻ dưới 3 tuổi: 1 gói/ngày.  
+ Trẻ trên 3 tuổi: 1 - 2 gói/ngày.  
+ Người lớn : 2 - 3 gói/ngày.

**Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác.  
Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

*Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.*

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

# ase Floris®

*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

**Thuốc bột cốm  
10 gói x 1g**

**ase Floris®**  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

Sản xuất tại:  
  
ISO 9001:2015  
GMP - WHO

CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT  
18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng  
ĐT: (0263) 3822022 - Fax: (0263) 3827773  
Website: [www.davac.com.vn](http://www.davac.com.vn)  
Hotline: 1800.5555.74

Số ĐK (Reg. No): QLSP-977-16  
Tiêu chuẩn: TCCS  
Số lô sản xuất (Lot):  
Ngày sản xuất (Mfd):  
Hạn dùng (Exp):




# ase Floris®

*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g

**Thuốc bột cốm  
10 gói x 1g**

**ase Floris®**  
*Lactobacillus acidophilus* 10<sup>8</sup>CFU/g



**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốm 1g có chứa:  
*Lactobacillus acidophilus*.....10<sup>8</sup>CFU/g  
Tà được vừa đủ.....1g




**Chỉ định:**  
- Điều trị phụ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.  
- Thay thế vi khuẩn chí bị mất do dùng kháng sinh.  
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**  
- Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh hoặc thiếu lactase.  
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng và cách dùng:**  
**Liều dùng:**  
+ Trẻ dưới 3 tuổi: 1 gói/ngày.  
+ Trẻ trên 3 tuổi: 1 - 2 gói/ngày.  
+ Người lớn : 2 - 3 gói/ngày.

**Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác. Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.



Sản xuất tại:  
**DAVAC**  
ISO 9001:2015  
GMP - WHO  
**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**  
18 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng  
ĐT: (0263) 3822022; Fax: (0263) 3827773  
Website: www.davac.com.vn  
Hotline: 1800.5555.74  
Số ĐK (Reg. No) : QLSP-977-16  
Tiêu chuẩn : TCCS  
Số lô sản xuất (Lot) :  
Ngày sản xuất (Mfd.):  
Hạn dùng (Exp) :

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng.  
Lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì  
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.  
Xin liên hệ bác sĩ hoặc dược sĩ nếu cần thêm thông tin.



**Thành phần:** Trong mỗi gói bột cốt 1g có chứa:  
*Lactobacillus acidophilus*.....10<sup>8</sup>CFU/g  
Tá được vừa đủ.....1g

**Chỉ định:**

- Điều trị phụ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.
- Thay thế vi khuẩn chỉ bị mất do dùng kháng sinh.
- Rối loạn tiêu hóa: Chướng bụng, đầy hơi.

**Chống chỉ định:**

- Không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh hoặc thiếu lactase.
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Liều dùng và cách dùng:**

**Liều dùng:**

- + Trẻ dưới 3 tuổi: 1 gói/ngày.
- + Trẻ trên 3 tuổi: 1 - 2 gói/ngày.
- + Người lớn : 2 - 3 gói/ngày.

**Cách dùng:** Ăn trực tiếp; trộn với thức ăn; pha với nước, sữa, trái cây, thức uống khác. Không dùng với thức ăn, nước uống nóng.

**Bảo quản:** Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

**CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT**  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
VẮC XIN PASTEUR  
ĐÀ LẠT

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng.  
Lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì  
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.  
Xin liên hệ bác sĩ hoặc dược sĩ nếu cần thêm thông tin.