

COLVAGI

SDK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:**Hoạt chất:**

Nifuratel.....500 mg

Nystatin.....200.000 IU

Tá dược: Dimethicone 1000, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Oxide sắt vàng, Titan dioxide, Nước tinh khiết.**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm đặt phụ khoa**DƯỢC LỰC HỌC**Nystatin là một kháng sinh kháng nấm, có phổ tác động rộng trên cả nấm men và các loại nấm tương tự nấm men, bao gồm *Candida albicans*.Nifuratel là dẫn chất nitrofurantoin với phổ kháng khuẩn rộng. Có hoạt tính kháng nấm *Trichomonas* âm đạo, có phổ kháng khuẩn tương tự như nitrofurantoin và một số tác dụng kháng nấm chống *Candida albicans*.

Nifuratel được dùng để điều trị các nhiễm trùng nhạy cảm ở đường âm đạo ở liều 200 đến 400 mg, uống 3 lần/ ngày. Thuốc có thể được dùng dạng đặt âm đạo.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nystatin có tác dụng tại chỗ, không có tác động gây hấp thu toàn thân.

Nifuratel dùng đường uống hấp thu qua đường tiêu hóa, chuyển hóa, được đào thải qua thận.

CHỈ ĐỊNHĐiều trị viêm nhiễm âm đạo – âm hộ do các chủng nhạy cảm gây ra như: *Candida*, *Trichomonas*, vi khuẩn nhạy cảm.**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn: 1 viên/ ngày trong 10-12 ngày liên tiếp.

Đặt viên thuốc sâu vào trong âm đạo vào buổi tối trước khi đi ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn cảm với nystatin hay nifuratel.

THẬN TRỌNG

1) Không nên dùng thuốc khi quan hệ tình dục

2) Chỉ sử dụng tại chỗ. Không được uống.

3) Khi điều trị kéo dài, phản ứng nhạy cảm có thể xảy ra. Nếu phản ứng nhạy cảm xảy ra, nên ngưng dùng thuốc và thay thế bằng liệu pháp điều trị thích hợp.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này và các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ có khả năng mang thai, hoặc đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Nên ngưng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong trường hợp phản ứng quá mẫn: ngứa, cảm giác rất bỏng, kích ứng âm đạo có thể xảy ra.

** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.***QUÁ LIỀU:** Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều.**BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.***ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm.

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm.

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

