

THUỐC GOUT

Bà Giăng

CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. Không dùng quá liều chỉ định. Xin thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn nếu xảy ra trong khi dùng thuốc. Không dùng thuốc quá hạn dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Mã tiền chế (<i>Semen Strychni praeparata</i>)	32,0 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	48,0 mg
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	48,0 mg
Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	40,0 mg
Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	40,0 mg
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	40,0 mg
Kim tiền thảo (<i>Herba Desmodii styracifolii</i>)	40,0 mg
Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>)	40,0 mg
Dây gấm (<i>Radix et Caulis Gneti montani</i>)	32,0 mg
Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	32,0 mg
Ba kích (<i>Radix Morindae officinalis</i>)	32,0 mg
Bồ công anh (<i>Herba Lactucae indicae</i>)	32,0 mg

Tá dược: Tinh bột sắn, magnesium stearate, vỏ nang cứng cỡ số 0 ... vừa đủ 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

Mô tả: Viên nang cứng, một đầu màu nâu, một đầu màu đỏ, trong nang có chứa cốm thuốc màu nâu, có mùi thơm dược liệu, vị đắng.

TÁC DỤNG: Thanh nhiệt, trừ thấp, thông lạc, chỉ thống.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị thống phong (gout), đào thải acid uric máu, trị sưng khớp, khô cứng khớp do lắng đọng urat, viêm khớp cấp hoặc mạn tính.

LIỀU DÙNG:

Người từ 18 tuổi trở lên: mỗi lần 3 viên x 3 lần/ngày.

CÁCH DÙNG: Ngày uống 3 lần, sau khi ăn 15-30 phút.

Đơn vị sản xuất thành phẩm:

 **NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC YHCT BÀ GIĂNG** CƠ SỞ SẢN XUẤT VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN GMP BÀ GIĂNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BAGIACO -
CHI NHÁNH HÀ NAM

Khu Công Nghiệp Thanh Liêm, X. Thanh Phong,
H. Thanh Liêm, T. Hà Nam.

Đơn vị sản xuất vị thuốc:

CƠ SỞ SẢN XUẤT VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN GMP BÀ GIĂNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BAGIACO -
CHI NHÁNH THANH HOÁ
Lô C4 -1, Khu công nghiệp Hoàng Long,
P. Tào Xuyên, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ:

Liệu trình 2-3 tháng đối với thể nhẹ, mới mắc. Đối với người bệnh nặng, liệu trình điều trị tuân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Lưu ý:

Khi có cơn gout cấp, có thể phối hợp thêm các thuốc điều trị khác

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người dưới 18 tuổi hoặc mắc cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Người có tiền sử dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn khoảng 30 phút.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ VỚI THUỐC:

Hạn chế rượu bia, thức ăn nhiều protid (đạm).

Chưa có báo cáo về tương tác, tương kỵ với các thuốc khác, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về việc sử dụng quá liều. Không sử dụng quá liều chỉ định của thuốc.

Khi đã sử dụng quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. Nếu có dấu hiệu bất thường báo ngay với bác sĩ hoặc dược sĩ.

THÔNG TIN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU PHI LÂM SÀNG:

Sản phẩm THUỐC GOUT BÀ GIÀNG phát triển dựa trên bài thuốc gia truyền THỐNG PHONG HOÀN BÀ GIÀNG đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng hạ acid uric máu, chống viêm và giảm đau ở các mức liều 1,037 và 3,11 g/kg/ngày trên chuột nhắt.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 3, 5, 6, 10, 15, 20 vỉ x 10 viên nang cứng.

Hộp 1 lọ x 50, 60, 100, 150, 200 viên nang cứng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.