

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIÊM XOANG



**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em.**

Thành phần: (cho 1 viên)*Thành phần dược chất:*Bạch chỉ (*Radix Angelicae dahuricae*) : 225mgBạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) : 225mgThương nhĩ tử (*Fructus Xanthii*) : 300mgPhòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) : 225mgHoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) : 375mgTân di hoa (*Flos Magnoliae*) : 225mgBạc hà (*Herba Menthae*) : 75mg*Thành phần tá dược:*

Tinh bột sắn, PVP K30, methylparaben, propylparaben, bột talc, magnesi stearat, nang gelatin rỗng (cỡ nang số 0).

Dạng bào chế: Viên nang cứng, màu xanh.**Quy cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ x 30 viên, 60 viên, 90 viên.**Tác dụng:** Tán phong, thông khiếu.**Chỉ định:** Nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi, nhức đầu vùng trán, viêm mũi dị ứng, viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính.**Cách dùng & liều dùng:**

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2-3 viên.

- Trường hợp nặng (các triệu chứng xảy ra với tần suất cao hơn, mức độ nặng hơn) có thể dùng gấp đôi liều trên.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.**Chống chỉ định:** Mẫn cảm với thuốc.**Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Hiện vẫn chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.**Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.**Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

- Tương tác của thuốc: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

- Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Trường hợp dùng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.**Tiêu chuẩn:** TCCS.

ABIPHA® - CNC
TÂM LÒNG TRƯỚC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHAĐịa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.Website: www.abipha.com.vn

Điện thoại: 024 6262 7788