

VIÊN HOÀN CỨNG

DUỠNG CỐT HOÀN

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 túi, 20 túi x túi 5 gam.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên hoàn cứng.

Mô tả: Viên hoàn cứng, hình cầu tròn đều, màu đen, mùi thơm đặc biệt của cao xương, vị ngọt hơi đắng.

THÀNH PHẦN: Cho 1 túi (5 gam) viên hoàn cứng:

Thành phần hoạt chất

Bột hỗn hợp dược liệu

tương đương 4,65 g dược liệu, bao gồm:

Hoàng bá (*Cortex Phellodendri*)

Tri mẫu (*Rhizoma Anemarrhenae*)

Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*)

Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*)

Cần khương (Gừng) (*Rhizoma Zingiberis*)

Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*)

Cao đặc xương hỗn hợp (gồm xương đầu, cẳng chi trước, sau

các động vật: trâu, bò, ngựa) (*Colla Ossis*)

Thành phần tá dược: Acid benzoic, đường trắng, parafin rắn,

than hoạt tính, bột Talc

v.đ

Hàm lượng

4,22 g

2,40 g

0,30 g

0,60 g

0,60 g

0,15 g

0,60 g

0,75 g

5 g

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- Nhức mỏi trong ống xương, đau lưng, mỏi gối, đau nhức xương khớp, cơ gân mềm yếu, đi lại khó khăn.
- Đau đầu, choáng váng, mặt mày xây xẩm do âm hư, hỏa vượng.
- Phòng và điều trị loãng xương ở người cao tuổi, phụ nữ mãn kinh.
- Hỗ trợ điều trị gãy xương sau khi bó bột.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

Mỗi lần uống 1 túi 5 g. Ngày uống 2 - 3 lần.

Uống với nước ấm hoặc nước muối loãng hoặc nước sắc gừng tươi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng cho người đang có rối loạn tiêu hóa, phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC:

Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Khi dùng quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Traphaco

Đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Sản xuất tại: Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Tel: 024.36810724 - 0221.3791016

Điện thoại liên hệ: 18006612