

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay của trẻ em

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tên thuốc: Siang Pure Oil Formula I

Thành phần cấu tạo của thuốc: Mỗi 100 ml dung dịch thuốc có chứa:

Menthol 38.60 g

Peppermint oil 39.60 ml

Camphor 6.90 g

- Tá dược: Clove oil; Cinnamon oil; chất tạo màu số 6, 11, 17; Mineral oil vừa đủ 100ml

Dạng bào chế:

- Dầu bôi ngoài da dạng dung dịch.

Chỉ định điều trị

- Giảm triệu chứng cảm lạnh, nhức đầu, chóng mặt, ngạt mũi.

- Giảm đau cơ, bầm tím, đau và ngứa do côn trùng cắn đốt.

Cách dùng và liều dùng

- Chỉ dùng ngoài. Không được uống.

- Bôi,塗り khi bị cảm lạnh, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu ngày 2-3 lần.

- Xoa bóp vào chỗ cơ bị đau, bầm tím, bôi vào chỗ côn trùng cắn (đốt) ngày 2-3 lần.

Chống chỉ định:

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

- Phụ nữ có thai và cho con bú

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Rửa tay ngay sau khi sử dụng. Không dùng cho các vết thương hở, da bị tổn thương hoặc bị kích ứng, ngừng sử dụng nếu bị kích ứng.

- Tránh tiếp xúc với mắt, màng nhầy hoặc các khu vực niêm mạc khác. Không băng chặt vùng da sau khi bôi thuốc. Tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu các triệu chứng vẫn tồn tại sau hai tuần, nên đi khám bác sỹ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Tránh sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Có nguy cơ tương tác với thuốc chống đông Warfarin (tăng nguy cơ chảy máu). Lưu ý không bôi đồng thời tại chỗ bị đau cùng với một chế phẩm khác. Hỏi ý kiến bác sỹ nếu phải điều trị đồng thời với một thuốc tại chỗ khác

Tác dụng không mong muốn:

- Các phản ứng mẫn cảm hay ban da có thể xảy ra

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Quá liều:

- Bôi ngoài da quá liều có thể gây kích ứng da.

- Hít phải liều lớn tinh dầu bạc hà có thể dẫn đến chóng mặt, lú lẫn, yếu cơ, buồn nôn và thị lực kép.

- Dùng sai cách: Nếu dùng đường uống, các triệu chứng sau đây có thể xảy ra:

mất ngủ, mất điều hòa, chóng mặt, co giật cơ bắp, đau bụng dữ dội, buồn nôn và ói mửa, rát trong miệng và cổ họng, nhức đầu, buồn ngủ, chậm nhịp tim, tim tái, tổn thương phổi, động kinh co giật, trầm cảm thần kinh trung ương và hôn mê.

Xử trí:

- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

- Rửa và hút dạ dày. Có thể dùng nước muối tẩy rửa như 30g natri sulphat trong 250ml nước.

- Kiểm soát co giật bằng diazepam tiêm tĩnh mạch.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 3ml, 7ml và 25ml.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

- Bảo quản dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

- Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Nhà sản xuất:

Bertram (1958) company Ltd.- 26/9 Lam Luk Ka Klong 7 Road, Moo 1, Bueng Kham Proi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand.

Công ty sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty CP XNK Y tế Việt nam - Vimedimex VN - 138 Giảng Võ, Hà Nội