

Dung dịch nhỏ mắt

Samil-Vidone

Povidon 20mg/ml

**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 10ml chứa:

- **Hoạt chất:** Povidon 200mg
- **Tá dược:** Dung dịch đậm đặc benzalkonium chlorid 10%, acid boric, natri clorid, natri hydroxid, nước pha tiêm.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 10ml**DẠNG BẢO CHẾ:** Dung dịch nhỏ mắt dạng nước, trong suốt, không màu.**Chất bảo quản BAK 10%:** 0,05mg/ml**→ Hữu dụng trong:**

- Làm giảm các triệu chứng của khô mắt.
- Mang kính tiếp xúc cứng.
- Kết hợp điều trị khô mắt trong Viêm kết - giác mạc dị ứng.

SDK: VN – 17583 - 13

Samilvidone (Povidon) tác dụng theo cơ chế cơ học. Sau khi nhỏ Povidon vào mắt, Povidon sẽ tạo thành một màng mỏng bao phủ bề mặt nhãn cầu, giúp:

- Ngăn chặn không cho nước mắt bốc hơi, giữ ẩm và bôi trơn bề mặt nhãn cầu.
- Là một màng đệm ngăn cách giữa lớp nước mắt và kính tiếp xúc cứng.
- Ngăn chặn dị ứng nguyên tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhãn cầu.

**DƯỢC LỰC HỌC:**

- Dung dịch nhỏ mắt Samilvidone không chứa bất kỳ hợp chất nào có hoạt tính dược lý.
- Do tính chất vật lý, các polymer tan trong nước không gây kích ứng có thể được dùng để làm ẩm và làm trơn bề mặt của mắt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Sau khi dùng đường uống, povidon có trọng lượng phân tử 12.600 được thải trừ nhanh trong nước tiểu, phần lớn được đào thải trong vòng 11 giờ.
- Sau khi dùng đường tĩnh mạch, có thể tránh được sự tích lũy povidon dài hạn bằng cách giảm tỉ lệ povidon trọng lượng phân tử cao hơn 25.000.
- Do kích thước tương đối lớn của phân tử povidon, không chắc có sự thâm nhập qua giác mạc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng povidon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CHỈ ĐỊNH:

Dung dịch nhỏ mắt Samilvidone được chỉ định để làm giảm triệu chứng kích thích do khô mắt và các triệu chứng của khô mắt. Thuốc còn có thể dùng như một dung dịch nhỏ mắt làm dễ chịu trong khi mang kính sát trùng cứng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nhỏ 1 giọt hoặc 2 giọt vào mắt bệnh, 4-5 lần/ngày. Liều dùng có thể thay đổi tùy theo triệu chứng của bệnh nhân.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các tác dụng không mong muốn đã được báo cáo bao gồm:

Rối loạn hệ thống miễn dịch:

- **Rất hiếm (<1/10000):** gây kích ứng hoặc phản ứng quá mẫn.

Rối loạn mắt:

- **Hay gặp ($\geq 1/100$ đến $< 1/10$):** thoáng bóng nhẹ hoặc cảm giác dính.
- **Chưa biết:** nhìn mờ.