

Methorfar 15

viên nén



CÔNG THỨC

- Dextromethorphan hydrobromid15 mg
- Tá dược: Lactose, Tinh bột ngô, Lycatab, Xanh Patent V, magnesi stearat
.....vừa đủ 1 viên nén.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích gây ho.
- Ho mạn tính không có đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

- Trẻ em 2 đến 6 tuổi: Uống $\frac{1}{2}$ viên, 6 - 8 giờ/ lần, tối đa 2 viên/ 24 giờ.
- Trẻ em 6 đến 12 tuổi: Uống 1 viên, 6 - 8 giờ/ lần, tối đa 4 viên/ 24 giờ.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên, 6 đến 8 giờ, tối đa 8 viên/ 24 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Người đang sử dụng thuốc ức chế MAO.
- Trẻ em dưới 2 tuổi

LƯU Ý - THẬN TRỌNG

- Ho quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen.
- Suy hô hấp
- Sử dụng dextromethorphan liều cao kéo dài có thể gây lạm dụng và phụ thuộc thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Dùng đồng thời với thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc của dextromethorphan.
- Quinidin làm tăng các tác dụng không mong muốn của dextromethorphan.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

- Phụ nữ có thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
- Dextromethorphan chưa được nghiên cứu kỹ về sự bài tiết qua sữa, vì vậy, cần cân nhắc thật kỹ khi dùng cho phụ nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Dextromethorphan có thể gây buồn ngủ, khả năng khi lái xe hay vận hành máy móc có thể bị ảnh hưởng do thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Rất hiếm gây buồn ngủ, rối loạn tiêu hóa.
- Có thể bị mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, nổi mề đay nhưng hiếm gặp.
 - * Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

- Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái mê, ảo giác.
- Xử trí: Chuyển ngay đến bệnh viện để được xử lý kịp thời.

DƯỢC LỰC HỌC

Dextromethorphan là thuốc giảm ho, thuốc có tác dụng lên trung tâm ho ở hành tủy. Mặc dù cấu trúc hóa học có liên quan đến morphin, dextromethorphan không có tác dụng giảm đau hay gây nghiện và ít có tác dụng an thần.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Dextromethorphan hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong vòng 15 - 30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng 6 - 8 giờ. Dextromethorphan được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong đó có dextrophan cũng có tác dụng giảm ho nhẹ.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

TRÌNH BÀY

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
- Hộp 1 lọ 180 viên nén.

BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C

CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quà, Q.12, TP.HCM, Việt Nam.