

Thuốc kháng viêm, giảm đau
PACIFIC KETOPROFEN Cao dán
(Ketoprofen 30mg)

Dược lực học

PACIFIC KETOPROFEN với thành phần Ketoprofen là 1 thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs). Giống như các thuốc chống viêm không steroid khác, thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ sốt.

Cơ chế chung cho các tác dụng đã nêu trên của Ketoprofen là do ức chế tổng hợp prostaglandin và leukotrien. Ketoprofen có tác dụng kháng bradykinin và cả tác dụng ổn định màng lysosom.

Vì được bào chế đặc biệt ở dạng cao dán, thuốc trực tiếp hấp thu qua da vào đến mô cơ xương và khớp nên làm giảm tác dụng phụ toàn thân so với các thuốc kháng viêm không steroid dùng đường uống.

Dược động học

Ketoprofen thấm tốt qua da và nhanh chóng đến được mô cơ xương và khớp. Thuốc được phát hiện trong huyết tương 1 giờ sau khi sử dụng, nồng độ Ketoprofen đạt được 30mg/ml sau 3 giờ và duy trì cho đến sau 24 giờ.

THÀNH PHẦN : Mỗi miếng dán chứa

Hoạt chất : Ketoprofen..... 30mg

Tá dược Propylenglycol monolaurat, Parafin lỏng, Hydrogenatedstyren/Methy Istyren/Inden copolymer, dung dịch Acrylic adhesive 1, dung dịch Acrylic adhesive 2, Polyisobutylen, Lint fabric.

CHỈ ĐỊNH :

PACIFIC KETOPROFEN được chỉ định điều trị các dấu hiệu và triệu chứng trong những trường hợp sau :

- 1) Viêm khớp biến dạng (viêm xương khớp)
- 2) Viêm quanh khớp xương cánh tay vai (đau , cứng , tê vai) .
- 3) Viêm bao gân , viêm gân .
- 4) Đau cơ .
- 5) Sưng , đau do chấn thương (do va đập ...)

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Dán 1 miếng PACIFIC KETOPROFEN lên chỗ đau , 2 lần /ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- 1) Chống chỉ định PACIFIC KETOPROFEN đối với bệnh nhân quá mẫn với thuốc này
- 2) PACIFIC KETOPROFEN không nên dùng cho những bệnh nhân bị hen suyễn hay có các phản ứng dị ứng khác khi dùng aspirin và các thuốc kháng viêm không steroid khác .

PHẢN ỨNG PHỤ

- 1) Trên da : Đôi khi có xảy ra đỏ da , phát ban , ngứa , khô da , kích ứng da , hiếm bị phù nề . Nên ngưng dùng thuốc nếu những triệu chứng này trở nên trầm trọng .
- 2) Phản ứng quá mẫn : Hiếm khi xảy ra các phản ứng phản vệ (nổi mề đay , khó thở , ...) . Ngưng dùng thuốc nếu những triệu chứng này xuất hiện .

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc

THẬN TRỌNG

- 1) Thuốc này chỉ dùng điều trị triệu chứng , không điều trị nguyên nhân
- 2) Trong trường hợp viêm có kèm nhiễm trùng da , cần thận trọng khi dùng chung với thuốc kháng sinh hoặc kháng nấm vì Ketoprofen có thể che dấu những dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng da thông thường .

*** Lưu ý**

- 1) Không dán thuốc lên mắt và niêm mạc .

- 2) Cần thận trọng khi dùng thuốc ở vết thương hở vì có thể xảy ra đau tạm thời hay kích ứng da .

- 3) Không nên dùng trong trường hợp vết thương được băng kín .

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ TRẺ EM

- 1) Tính an toàn của Ketoprofen đối với phụ nữ có thai chưa được nghiên cứu đầy đủ , không nên sử dụng rộng rãi trong thời gian dài đối với phụ nữ có thai .

- 2) Tính an toàn của Ketoprofen khi sử dụng ở trẻ em chưa được biết rõ .

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không có tác động đối với lái xe và vận hành máy móc.

BẢO QUẢN

Giữ trong bao bì kín , ở nhiệt độ dưới 30°C , tránh ánh sáng trực tiếp

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TRÌNH BÀY : Hộp 20 gói x 6 miếng

KHUYẾN CÁO :

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng .
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ .

PACIFICPHARMA CORPORATION
36, Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Tel : 82-31-612-0220 Fax : 82-31-612-0259