

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Văn Bình Hương



140 x 200 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Labavie

Gói 1 g thuốc bột

Thành phần
Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU
Bacillus subtilis 10⁹ CFU
Tá dược vớ 1 gói
(Lactose, Saccharose, Aerosil, Bột hương dầu,
Magnesi stearat)

Tính chất: Thuốc bột, dạng hạt nhỏ màu hồng nhạt, đồng
nhất, vị ngọt, mùi thơm.

Cơ chế tác dụng

Sự kết hợp giữa 2 chủng probiotic *Lactobacillus acidophilus* và *Bacillus subtilis* trong Labavie giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh đường ruột, duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

- *Lactobacillus acidophilus* sinh acid lactic trong quá trình lên men, acid hóa đường ruột ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, tiết các chất diệt khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

- *Bacillus subtilis* có khả năng sản sinh nhiều enzym thuộc hệ thống men tiêu hóa. Trong đó có enzym amylase xúc tác thủy phân tinh bột, glycogen; enzym protease và lipase giúp tiêu hóa đạm, mỡ trong thức ăn, nâng cao nhu động ruột. *Bacillus subtilis* còn có khả năng sinh tổng hợp một số chất kháng sinh có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt một số vi sinh vật và nấm gây bệnh.

Chỉ định

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa trong các trường hợp:

- Tiêu chảy.
- Viêm ruột cấp tính hay mạn tính.
- Trạng thái cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do dùng kháng sinh, rối loạn tiêu hóa...

Liều dùng và cách dùng

Liều dùng:

- Liều thông thường:
 - + Người lớn, trẻ em > 15 tuổi: 1 gói/lần, 3 gói/ngày.
 - + Trẻ em 11-15 tuổi: 1 gói x 2 lần/ngày.
 - + Trẻ em 8-11 tuổi: 1/2 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 5-8 tuổi: 1/3 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 3-5 tuổi: 1/4 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 1-3 tuổi: 1/5 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 3 tháng-< 1 tuổi: 1/10 gói x 3 lần/ngày.
- Tiêu chảy: 4-8 gói/ngày.
- Táo bón: 6 gói/ngày.

- Rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh:

- + Liều dự phòng: 2 gói/ngày.
- + Liều điều trị: 4-8 gói/ngày cho đến khi hết triệu chứng bệnh.

Cách dùng: Dùng đường uống, có thể pha bột thuốc trong nước đun sôi để nguội, sữa hoặc nước hoa quả, tốt nhất là uống lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn.

Chống chỉ định

Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn

- Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhưng hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị.
- Nhiễm acid chuyển hóa đã xảy ra sau khi dùng viên nén có chứa *Lactobacillus acidophilus*, đôi khi táo bón.
- Nhiễm trùng huyết liên quan đến *Lactobacillus acidophilus* đã được báo cáo.

Thận trọng

- Sau 2 ngày điều trị mà vẫn tiêu chảy, cần khám lại.
- Người sốt cao chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác

Labavie ngăn cản sự hấp thu của tetracyclin.

Quá liều và cách xử trí

Chưa thấy có dấu hiệu quá liều.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa có ghi nhận tác dụng phụ.

Tác dụng khi lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Trình bày: Hộp 30 gói thuốc bột x gói 1 g. Gói nhôm.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Không dùng thuốc quá hạn dùng trên bao bì.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam



Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

<https://nhathuocngocanh.com/>