

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx. Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

NOFOTAI 50

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa:

Thành phần hoạt chất: Cao khô tam thất (*Extractum Radicis Notoginseng siccum*) 66,67 mg (tương đương saponin toàn phần 50 mg)

Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể 101, talc, magnesi stearat, silic dioxyd dạng keo khan vừa đủ.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng (viên nang cứng nắp màu đỏ, thân màu đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, thơm mùi đặc trưng của dược liệu).

CHỈ ĐỊNH

- Dự phòng và điều trị các bệnh lý liên quan mạch máu não như : Nhồi máu não do huyết khối và xơ vữa động mạch, thiếu năng tuần hoàn não, di chứng tai biến mạch máu não.
- Điều trị đau thắt ngực; sau khi nhồi máu cơ tim.
- Dự phòng và hỗ trợ điều trị rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng:

- Điều trị: Mỗi lần uống 2 viên, 2 - 3 lần mỗi ngày.
- Dự phòng và chống tái phát: Uống 1 – 2 viên mỗi ngày.

Cách dùng: Uống thuốc với 1 ly nước ấm

Một đợt dùng thuốc tối thiểu là 4 tuần hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai.
- Giai đoạn cấp của xuất huyết não.
- Đang có xuất huyết đường tiêu hóa.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Dùng thận trọng cho người đang chảy máu, rối loạn đông huyết hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC
Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Các tác dụng phụ bao gồm:

- Khô họng, đỏ mắt, đánh trống ngực.
- Đôi khi nổi mẩn có thể xảy ra (ngưng thuốc sẽ khỏi).
- Rất hiếm xảy ra phản ứng quá mẫn.

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HẠI GẤP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: Sản phẩm này có thành phần chính là Cao khô Tam thất (*Extractum Radicis Notoginseng siccum*) được chiết xuất từ rễ cây Tam thất (*Radix ~~Panaxis~~ notoginseng*, họ *Araliaceae*). Theo ĐDVN 4 Tam thất có công năng: Tán ứ chỉ huyết, tiêu sưng, giảm đau, chủ trị: Các loại chảy máu có ứ huyết như thổ huyết, khối huyết, nục huyết, tiểu tiện ra huyết, sưng đau do chấn thương, ngực bụng đau nhói. Các nghiên cứu cho thấy Tam thất có chứa từ 4,42 – 12% saponin kiểu protopanaxadiol và protopanaxatriol, các ginsenosid, glucogensenosid và notoginsenosid có tác dụng tăng lực, giãn mạch ngoại biên, điều hòa miễn dịch, hoạt huyết, cầm máu, tiêu ứ huyết, tiêu sưng và giảm đau. Tại Trung Quốc và Nhật Bản người ta đã ứng dụng làm thuốc chống đột quỵ do huyết khối ở dạng thuốc tiêm và thuốc viên có hiệu quả tốt.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm)

Hộp 1 chai 30 viên hoặc 60 viên (Chai nhựa HDPE)

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NEWSUN

Địa chỉ: 43/14 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 62609629

CƠ SỞ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Địa chỉ: Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.