



THÔNG TIN SẢN PHẨM

EPREX®

Ống tiêm chứa sẵn thuốc Epoetin alfa


THÀNH PHẦN:

Hoạt chất epoetin alfa là một glycoprotein được sản xuất bằng kỹ thuật tái tổ hợp AND.

Hàm lượng: 1.000 IU/0,5mL; 2.000 IU/0,5mL; 3.000 IU/0,3mL; 4.000 IU/0,4mL hoặc 10.000 IU/1mL. Epoetin alfa là dung dịch vô trùng dùng để tiêm.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị thiếu máu do suy thận mạn ở bệnh nhân nhi và người lớn thẩm phân máu, thẩm phân phúc mạc và người lớn tiền thẩm phân..

LIỀU DÙNG: Bệnh nhân suy thận mạn: Chỉ nên dùng đường tiêm tĩnh mạch. Nồng độ hemoglobin đích nên là 10-12 g/dL (6,2-7,5 mmol/L) ở người lớn và 9,5-11 g/dL (5,9 - 6,8 mmol/L) ở trẻ em. Khi thay đổi đường tiêm, nên khởi đầu cùng 1 liều và sau đó điều chỉnh để đạt nồng độ hemoglobin trong khoảng nồng độ giới hạn. Trong giai đoạn chỉnh liều, nên tăng liều epoetin alfa nếu hemoglobin tăng <1 g/dL mỗi tháng. Thông thường ghi nhận mức gia tăng hemoglobin có ý nghĩa lâm sàng sau hơn 2 tuần và có thể đến 6-10 tuần ở một vài bệnh nhân. Nên giảm liều khi hemoglobin đạt được 12 g/dL: bỏ một liều trong mỗi tuần hoặc giảm số lượng thuốc mỗi liều.



LIỀU DÙNG EPREX (IU/kg/liều)	Người lớn đang chạy thận nhân tạo	Người lớn thẩm phân phúc mạc	Người lớn trước lọc thận	Trẻ em đang chạy thận nhân tạo/ thẩm phân
Giai đoạn chỉnh liều <i>Liều khởi đầu</i>	50 IU/kg 3 lần/tuần	50 IU/kg 2 lần/tuần	50 IU/kg 3 lần/tuần	50 IU/kg 3 lần/tuần
Tăng liều <i>(ít nhất trong 4 tuần)</i>	25 IU/kg 3 lần/tuần	25 IU/kg 2 lần/tuần	25 IU/kg 3 lần/tuần	25 IU/kg 3 lần/tuần
Giai đoạn duy trì Liều thông thường	25-100 IU/kg 3 lần/tuần	25-50 IU/kg 2 lần/tuần	17-33 IU/kg 3 lần/tuần (tiêm IV) 1 → 2 lần/tuần (tiêm SC)	*
Đường tiêm	Chỉ nên tiêm tĩnh mạch (IV)	Chỉ nên tiêm IV	Chỉ nên tiêm IV hoặc tiêm SC	Chỉ nên tiêm IV hoặc tiêm SC
* LIỀU DUY TRÌ Ở TRẺ EM		Liều (IU/kg, 3 lần/tuần)		
Trọng lượng (kg)	Trung bình		Liều duy trì thường dùng	
<10	100		75-150	
10-30	75		60-150	
>30	33		30-100	

Cách dùng: Cũng như các thuốc dùng đường tiêm khác, dung dịch tiêm phải được kiểm tra về các tiểu phân và sự biến màu trước khi tiêm. Không được lắc, vì lắc có thể làm biến tính glycoprotein làm bất hoạt thuốc. Epoetin alfa ở dạng ống tiêm sử dụng 1 lần không chứa chất bảo quản. Không được tái sử dụng ống tiêm. Bỏ những phần không sử dụng.

Tiêm tĩnh mạch: Epoetin alfa nên được tiêm ít nhất trên 1 phút đến 5 phút, tùy thuộc vào tổng liều. Nên tiêm chậm trên bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng giả cúm khi điều trị. Ở bệnh nhân thẩm phân máu, nên tiêm thuốc 1 lần trong suốt quá trình thẩm phân thông qua cửa tĩnh mạch thích hợp trên đường thẩm phân. Ngoài ra, có thể tiêm qua kim truyền ngay khi kết thúc thẩm phân, sau đó dùng 10 mL nước muối đẳng trương để rửa ống và đảm bảo thuốc được tiêm hoàn toàn vào tuần hoàn chung. Epoetin alfa không được chỉ định truyền tĩnh mạch hoặc pha trộn với các thuốc khác.