



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH CAPS

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 viên nang cứng

Thành phần hoạt chất:	
Cao khô lá Bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>) Tương đương 4,8 mg Ginkgo flavon Glycosid toàn phần)	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (<i>Extractum Polysciacis fruticosae spissum</i>) Tương đương 45 mcg acid Oleanolic Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ) (<i>Polyscias fruticosa</i>)	150 mg
Thành phần tá dược:	
Methylparaben, Propylparaben, Coloidal anhydrous silica, Microcrystallin cellulose M101, Calci carbonat, Magnesi stearat, Bột talc, Vỏ nang số 0 (xanh-xanh) vừa đủ 01 viên	

4. Dạng bào chế: Viên nang cứng

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, thân và nắp nang màu xanh, bột thuốc bên trong màu vàng nâu đến nâu, thơm mùi dược liệu.

5. Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ

6. Cách dùng, liều dùng:

- Người lớn uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai
- Người đang xuất huyết, rối loạn đông máu.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:



- Ở những bệnh nhân có bệnh lý có xu hướng tăng nguy cơ chảy máu (chảy máu nội tạng), đang điều trị bằng thuốc chống đông, thuốc kháng tiểu cầu, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

- Thuốc (có chứa Bạch quả) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Để phòng ngừa, cần ngừng dùng thuốc này 3 đến 4 ngày trước khi phẫu thuật.

- Ở bệnh nhân động kinh, không thể loại trừ tăng khởi phát cơn co giật do uống thuốc (có chứa Bạch quả).

- Không nên sử dụng đồng thời thuốc (có chứa Bạch quả) với Efavirenz

- Thuốc có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm)

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: Không dùng thuốc này do các nghiên cứu trên động vật và nghiên cứu invitro cho thấy bằng chứng yếu về tác dụng kháng tiểu cầu của Bạch quả và do đó sử dụng trong quá trình chuyển dạ có thể kéo dài thời gian chảy máu.

- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sự an toàn của Bạch quả đối với phụ nữ cho con bú nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy nhiên, do tác dụng không mong muốn của thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt nên cần thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc trong khi dùng thuốc này

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác: Bạch quả có thể có tác dụng đối kháng với các yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, vì vậy không dùng chung thuốc này với các thuốc chống đông máu hoặc thuốc ảnh hưởng tới sự kết tập tiểu cầu.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Thuốc chứa Bạch quả có thể gây ra các tác dụng phụ bao gồm: đau đầu, chóng mặt, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chảy máu và phản ứng quá mẫn ở da

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- Quá liều: khi dùng thuốc quá liều có thể xảy ra: ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Xử trí: Nếu thấy có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc quá liều, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 túi x 2 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 2 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên;
- Hộp 1 túi x 3 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 3 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên
- Hộp 1 túi x 6 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 6 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên
- Hộp 1 túi x 10 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 10 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên
- Hộp 1 lọ (nhựa HDPE) x 30 viên
- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 60 viên
- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 100 viên

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Điều kiện bảo quản sau khi mở nắp lọ: vặn chặt nắp lọ, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; 30 ngày sau khi mở nắp lọ lần đầu
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98

Ngày 15 tháng 4 năm 2024



Trịnh Đăng Hùng