

Catidral® plus

GÓI

3g Diosmectite + Chất điện giải

Hộp gồm 20 gói bột pha hỗn dịch uống tức thời

Thiết bị y tế sử dụng một lần



KHÔNG CHỨA GLUTEN

THÀNH PHẦN

Mỗi gói chứa 3.00g Diosmectite, 0.263g Natri Clorid, 0.0373g Kali Clorid, 0.162g Trikali citrate khan, 0.147g Trinatri citrate khan, 1.982g Glucose (Dextrose khan). Tá dược bao gồm: Guar gum thủy phân một phần (PHGG); Vanillin; Silicon dioxide; Hương vani; Chất tạo màu: beta-carotene.

MÔ TẢ SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Catidral® plus là thiết bị y tế sử dụng một lần, được bào chế dưới dạng bột đóng gói, dùng để pha hỗn dịch uống tức thời. Mỗi gói chỉ sử dụng một lần sau khi mở.

Pha toàn bộ lượng bột trong một gói **với 100 ml nước**. Để thu được hỗn dịch đồng nhất, cho bột vào cốc, thêm nước và khuấy chậm cho đến khi bột phân tán đều. Khuyến cáo dùng **Catidral® plus** vào giữa các bữa ăn.

CHỈ ĐỊNH

Catidral® plus dùng trong tiêu chảy cấp và mạn tính; các triệu chứng đau liên quan tới bệnh đường tiêu hóa.

Catidral® plus được chỉ định để dự phòng tiêu chảy do hóa trị và xạ trị.

LIỀU KHUYẾN CÁO

Cho 3 ngày đầu tiên:

Trẻ em > 2 tuổi: dùng tới 4 gói mỗi ngày.

Người lớn: dùng tới 6 gói mỗi ngày. Sau đó tiếp tục giảm dần liều lượng cho đến khi hết tiêu chảy.

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Catidral® plus không nên được sử dụng quá 5 ngày liên tục. Nếu các triệu chứng vẫn còn, tham khảo ý kiến bác sĩ.

CATIDRAL® PLUS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Mỗi gói **Catidral® plus** chứa Diosmectite và các chất điện giải. Diosmectite là một loại đất sét tự nhiên có cấu trúc tinh thể gồm nhiều lớp mỏng xếp chồng lên nhau, nhờ đó có khả năng hấp phụ cao. Cấu trúc này giúp Diosmectite giữ lại lượng dịch dư thừa trong lòng ruột, làm phân đặc hơn và làm chậm quá trình đào thải ra ngoài.

Nhờ cơ chế này, **Catidral® plus** có thể giúp giảm nguy cơ mất nước do tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ đưa cân bằng nước – điện giải trở về trạng thái bình thường nhờ hàm lượng điện giải cân đối trong sản phẩm.

Bên cạnh đó, nhờ khả năng hấp phụ cao, Diosmectite còn giúp **Catidral® plus** tương tác với các glycoprotein trong lớp chất nhầy bao phủ niêm mạc dạ dày – tá tràng. Sự tương tác này làm thay đổi đặc tính vật lý của lớp chất nhầy, từ đó hình thành một lớp gel bảo vệ, giúp bảo vệ niêm mạc trước tình trạng tăng tiết acid và các tác nhân có hại cho dạ dày.

LƯU Ý AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang sử dụng Catidral plus đồng thời với các liệu pháp điều trị khác. Để **Catidral® plus** xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng **Catidral® plus** nếu bao bì gốc không còn nguyên vẹn. Không sử dụng Catidral® plus sau ngày hết hạn ghi trên bao bì.

CẢNH BÁO

Do có khả năng hấp phụ cao, Diosmectite có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu qua đường tiêu hóa của một số thuốc dùng đường uống. Vì vậy, các thuốc hoặc liệu pháp điều trị đường uống khác nên được dùng cách xa thời điểm sử dụng **Catidral® plus**.

Không sử dụng **Catidral® plus** cho người đang bị táo bón. Người bị tiểu đường hoặc đang ăn chế độ ăn kiêng đặc biệt cần lưu ý **Catidral® plus** có chứa đường.

Nếu đang sử dụng thuốc, tham khảo bác sĩ, chuyên gia y tế trước khi sử dụng **Catidral® plus**. Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú, tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Không nên sử dụng **Catidral® plus** sau ngày hết hạn ghi trên bao bì sản phẩm.

Bảo quản **Catidral® plus** ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt, độ ẩm và tránh tiếp xúc với nước.

Hạn sử dụng chỉ có giá trị đối với sản phẩm còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng cách.

NHÀ SẢN XUẤT

Pharma Line S.r.l. Via Bertani 2-20154 Milan, Ý.
Catidral là nhãn hiệu đã được đăng ký bởi Pharma Line S.r.l.

Hướng dẫn sử dụng quốc tế Catidral® plus -
Phiên bản số 00, tháng 05/2026

KÝ HIỆU

-  THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG 1 LẦN
-  ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
-  BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ GIỮA 0° VÀ 40°C
-  TRÁNH TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI VÀ NGUỒN NHIỆT
-  TRÁNH TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI VÀ NGUỒN NHIỆT
-  CẢNH BÁO
-  NHÀ SẢN XUẤT
-  SỐ LÔ
-  NGÀY HẾT HẠN

